



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA

ORDIN

mun. Chișinău

09 octombrie 2026

Nr. 468

Cu privire la implementarea vaccinului hexavalent

În scopul simplificării schemei de vaccinare, asigurării unei protecții eficiente împotriva difteriei, tetanosului, tusei convulsive, hepatitei virale B, infecțiilor cauzate de *Haemophilus influenzae* tip b și poliomielitei și în temeiul art. 52 alin. (4) și (5) din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice, pct. 63 subpct.1 din Programului Național de Imunizări aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 211/2023,

ORDON:

1. Se aprobă Instrucțiunea privind implementarea vaccinului hexavalent (DTP-HepB-Hib-VPI) împotriva difteriei, tetanosului, tusei convulsive, hepatitei virale B, infecției cu *Haemophilus influenzae* tip b și poliomielitei, în cadrul Programului național de imunizări pentru anii 2023–2027, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 211/2025, conform anexei.

2. Directorul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică va asigura:

2.1. suport metodologic și consultativ pentru implementarea prezentului ordin;

2.2. organizarea instruirii personalului medical privind administrarea vaccinului hexavalent;

2.3. monitorizarea introducerii complete și în termen a datelor privind vaccinarea în Registrul Electronic Național de Vaccinare.;

2.4. monitorizarea respectării condițiilor de păstrare, transport și utilizare a vaccinului hexavalent, inclusiv a menținerii lanțului frig;

2.5. evaluarea indicatorilor de acoperire vaccinală la nivel teritorial, monitorizarea stocurilor și a evenimentelor adverse post imunizare.

2.6. monitorizarea reacțiilor adverse post-imunizare și raportarea acestora către Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale.

3. Conducătorii instituțiilor medico-sanitare publice, Centrelor de sănătate/Centrelor medicilor de familie, Asociații medicale teritoriale, Direcției

generale asistență medicală și socială a Primăriei municipiului Chișinău, Direcției sănătății și protecției sociale a populației UTA Găgăuzia, Secției sănătății a primăriei mun. Bălți, vor asigura:

3.1.identificarea și estimarea anuală a numărului de copii, în vederea planificării necesarului de vaccin;

3.2.organizarea instruirii personalului medical implicat în activitățile de imunizare privind particularitățile utilizării vaccinului hexavalent;

3.3.evaluarea periodică a acoperirii vaccinale, identificarea copiilor nevaccinați sau subvaccinați și întreprinderea măsurilor necesare pentru recuperarea acestora;

3.4.asigurarea informării părinților și reprezentanților legali privind beneficiile și siguranța vaccinului hexavalent;


3.5.respectarea condițiilor de păstrare a vaccinului conform cerințelor lanțului frig și administrarea în conformitate cu actelor normative;

3.6.asigurarea introducerii complete și în termen a datelor privind vaccinarea în Registrul Electronic Național de Vaccinare.

4. Prezentul ordin este plasat pe pagina web oficială a Ministerului Sănătății.

5. Controlul executării prezentului ordin se atribuie Secretarilor de Stat.

Ministru



Alexandru GASNAȘ

Instrucțiunea privind schema de implementare a vaccinului hexavalent

1. Schema primară constă din 3 doze a câte 0,5 ml, administrate intramuscular la vârstele de 2, 4 și 6 luni, cu respectarea intervalului de 2 luni între doze, pentru obținerea unui răspuns imun optim:

1.1. vaccinarea primară a copiilor la vârsta de 2, 4 și 6 luni se efectuează cu vaccinul hexavalent.

1.2. vaccinul hexavalent trebuie administrat intramuscular profund, în regiunea antero-laterală a coapsei. Este interzisă administrarea intravenoasă, subcutanată sau intradermică.

1.3. vaccinul hexavalent se administrează concomitent cu vaccinurile prevăzute în calendarul național de vaccinare la vârstele respective.

1.4. persoana vaccinată va fi supravegheată minimum 15–30 minute după administrare. În cabinetul de vaccinare, va fi asigurată disponibilitatea trusei de prim ajutor în caz de reacție anafilactică. Reacțiile adverse suspectate vor fi raportate prin Registrul Electronic National de Vaccinare (RENV) în conformitate cu actele normative.

1.5. vaccinarea cu vaccinul hexavalent se va efectua cu respectarea strictă a indicațiilor și contraindicațiilor către vaccinare, conform instrucțiunii de la producător. La fel ca în cazul altor vaccinuri, administrarea vaccinului hexavalent trebuie amânată la copii cu boală febrilă acută severă.

1.6. componenta poliomieltică inactivată (VPI) este inclusă în vaccinul hexavalent și, pentru copiii eligibili pentru vaccinarea cu vaccin hexavalent, nu se administrează vaccinul VPI separat.

2. Copii care au început schema de vaccinare cu vaccin împotriva difteriei, tetanosului, tusei convulsive, hepatitei virale B, infecțiilor cauzate de *Haemophilus influenzae* tip b (DTP-HepB-Hib), în continuare vaccin pentavalent și vaccin împotriva poliomielitei separat vor continua schema imunizare cu vaccinul hexavalent, fără reluarea schemei de vaccinare.

3. Imunizarea copiilor care au prezentat reacții adverse severe la componenta pertussis celulară a vaccinului hexavalent, vor continua imunizarea împotriva difteriei, tetanosului, hepatitei B, poliomielitei prin administrarea separată a vaccinurilor DT, HepB, VPI.

4. Imunizarea copiilor în cazul abaterilor de la Calendarul Național de Vaccinări:

4.1. Copiii care nu au inițiat vaccinarea la vârsta de 2 luni vor începe vaccinarea împotriva acestor infecții cu vaccinul hexavalent cât mai curând posibil, respectând intervalul minim de 4 săptămâni între doze.

4.2. Administrarea unei doze de vaccin hexavalent la un interval mai mare decât cel recomandat de 2 luni, nu necesită reluarea seriei de vaccinare, iar schema va fi continuată de la doza omisă.

4.3. Copii care au fost vaccinați anterior cu 1 sau 2 doze de vaccin pentavalent fără a primi concomitent și dozele de vaccin împotriva poliomielitei (VPI sau bOPV) din

diferite motive, li se va asigura că până la vârsta de 1 an primesc cele 3 doze de vaccin împotriva poliomielitei.

4.4. Administrarea vaccinului hexavalent este permisă până la împlinirea vârstei de 4 ani.

4.5. Copiii cu vârsta mai mare de 4 ani care nu au primit anterior nicio doză de vaccin împotriva difteriei, tetanosului și tusei convulsive nu vor iniția schema de vaccinare cu vaccin hexavalent. Imunizarea acestor copii se va efectua conform schemei de recuperare vaccinală, prin administrarea a două doze de vaccin diftero-tetanic pediatric (DT), cu respectarea unui interval minim de 4 săptămâni între doze.

4.6. Vaccinul hexavalent conține componentul pertusis celular, și în cazul unor abateri de la calendarul național de vaccinare poate fi administrat concomitent cu vaccinurile de rutină ale calendarului, cu excepția vaccinurilor cu component viu atenuat (ex. vaccinul ROR sau BCG).